

HIV test strategie voor de huisartsenpraktijk

HIV in Suriname: Suriname heeft een gegeneraliseerde HIV epidemie, met hogere prevalentie onder specifieke populaties. De prevalentie van HIV is 1,4% onder 15-49 jarigen^a.

Testen op HIV in de huisartsen praktijk

- Laat laagdrempelig testen op HIV
- Indicaties om zeker te testen staan onder en naast beschreven, maar bied ook andere patiënten aan om een HIV test te verrichten
- Stel patiënten op de hoogte als u een HIV test doet
- Testen op HIV is vrijwillig en niet verplicht of gedwongen
- Bij positieve HIV-test: doe counseling en zie flowchart HIV behandeling

Let op

- Confidentialiteit en anonimiteit moeten altijd gegarandeerd zijn.
- Laat veronderstelde afwezigheid van risico u er niet van weerhouden om een HIV test aan te bieden wanneer er een klinische indicatie is.
- Er bestaat een WINDOW PERIODE waarbij de patiënt wel HIV geïnfecteerd kan zijn maar nog onvoldoende antistoffen gevormd heeft. De HIV test is dan (nog) negatief. Test bij hoge verdenking na 3 maanden opnieuw.

TEST ZEKER HIV BIJ	HERTESTEN
Zwangere vrouw en partner	3 ^e trimester (rond amenorroe duur 30 wk)
Key populations: MSM, transgender, sekswerker, iv drugsgebruiker, gevangene	Tenminste één keer per jaar Let op: Test ook op syfilis en HBV Test HCV bij MSM en iv drugsgebruikers
HIV positieve partner	Eén keer per jaar
Wisselende seksuele contacten	Eén keer per jaar

Andere indicaties voor testen

- **Klachten:** Gewichtsverlies, koorts, chronische diarree
- **Onderzoek:** Lymfadenopathie
- **Lab:** leukopenie, trombopenie, verhoogde bezinking (BSE)
- **Andere aandoeningen:**
 - Andere SOIs (HBV, HCV, syfilis, gonorroe, chlamydia)
 - Tuberculose
 - Pneumonie (bij eenmaal, maar zeker bij recidief)
 - Candida
 - Auto-immuunziektes met agressieve immuunsuppressiva
 - Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP)
 - Onverklaarde verminderde nierfunctie
- **Dermatologisch:** Kaposi sarcoom, seborrhoïsche dermatitis, herpes simplex, herpes zoster, ernstige psoriasis
- **Oncologisch:** primair RIP brein, cervixkanker, anuskanker, longkanker, lymfoom
- **Neurologisch:** mononeuritis, subcorticale dementie, MS-achtig beeld, young stroke, perifere neuropathie

- **Kinderen** onder 18 maanden: bij indicatie voor HIV test verwijzen naar kinderarts
- Kinderen van HIV positieve moeder: ook laten testen indien hun status onbekend is

Afkortingen:

HBV	Hepatitis B Virus	MS	Multipele Sclerosis
HCV	Hepatitis C Virus	RIP	Ruimte Innemend Proces
MSM	Men having Sex with Men	SOI	Seksueel Overdraagbare Infectie

^aBron: UNAIDS (<http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/suriname>)