


Naam document: Werkwijze cohortisolatie COVID-19			
Versie: 10 augustus 2020 V2	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

Doel

Voorkomen overdracht van micro-organismen door het toepassen van isolatiemaatregelen bij meerdere patienten in cohort.

Wanneer

Maatregelen toepassen op afdeling/unit met meerdere positieve COVID-patienten op zaal.

Indicatie

Micro-organismen die zich verspreiden via de lucht, via direct contact en via voorwerpen besmet met patiëntenmateriaal en ernstige gevolgen hebben. Deze isolatievorm wordt alleen nog op indicatie van infectiepreventie toegepast!


Druppel-contactisolatie wordt **n a m e l i j k** toegepast om andere patiënten, bezoekers en medewerkers niet te besmetten.

Besmetting

Vindt plaats via druppeltjes in de lucht, maar mogelijk ook indirect via handen of voorwerpen. Deze vorm van isolatie is voor ziekten die zich verspreiden via druppels over een afstand tot plm. 1,5 meter.

Ruimte

- Cohort unit met schone aankleedruimte en vuile uitkleedruimte bij toegang van de afdeling/unit.
- Voor aankomst dient men werkkleding (scrubsuit) aan te trekken. Dit geschiedt in een schone ruimte.
- Patiënten positief voor COVID-19 mogen samen in 1 in cohort worden verpleegd.
- Geen verdachte en positieve patiënten in 1 cohort verplegen.
- Geef duidelijk op de toegangsdeur van de afdeling aan dat het een isolatie afdeling is.
- Afdeling gaat dicht voor overige medewerkers/teams (alleen indien noodzakelijk).
- Alle medewerkers die de unit betreden dragen de hieronder beschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Regel af- en aanvoer materialen/wasgoed en afval.
- Draag eventuele draadcontainers/karretjes aan de deur over. Medewerkers van transport dragen zo nodig handschoenen. Trek de eventuele handschoenen hierna uit en was of desinfecteer de handen.
- Spreek een procedure af voor aan- en afvoer van maaltijden met keuken/cateraar. Geen bijzonderheden voor serviesgoed. Serviesgoed wordt in een afwasmachine, de centrale

Naam document: Werkwijze cohortisolatie COVID-19			
Versie: 10 augustus 2020 V2	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

wasstraat of handmatig afgewassen. Medewerkers van transport dragen zonodig handschoenen. Trek de eventuele handschoenen hierna uit en was of desinfecteer de handen.

- Medewerkers trekken de werkkleding op de afdeling uit. Deze thuis wassen en buiten drogen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Aantrekken voor de afdeling/unit:

- Handen desinfecteren/wassen
- Schort met lange mouwen (schrijf naam op schort)
- Chirurgisch mondneusmasker. FFP2/KN95 bij aërosolvormende handelingen
- Bril / faceshield
- Handschoenen
- Handhygiëne Volgens de 5 momenten van de WHO
N.B. Ook na uittrekken van handschoenen handhygiëne toepassen

Uittrekken in de vuile omkleedruimte (oranje):

- Handschoenen
- Handen desinfecteren/wassen
- Schort met lange mouwen (buitenkant niet aanraken)
- Handen desinfecteren/wassen
- Masker afzetten
- Bril of faceshield afzetten en desinfecteren met alcohol 70%
- Handen desinfecteren/wassen
- Vervolgens nieuw (eigen) masker opzetten.

Kleding patiënt

Op normale wijze behandelen

Voedsel


Op normale wijze behandelen

Feces, urine en braaksel

Op normale wijze afvoeren

Linnengoed

In rode linnenzak.

Naam document: Werkwijze cohortisolatie COVID-19			
Versie: 10 augustus 2020 V2	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

Serviesgoed

Op normale wijze behandelen

Afval

Volgens de vastgestelde afvalscheidingsprocedure

Materialen

- Alle benodigdheden voor verpleging en eenvoudig onderzoek moeten op de cohort unit aanwezig zijn.
- Materialen die de cohort unit verlaten reinigen en daarna desinfecteren met alcohol 70%.

Instrumentarium

Op normale wijze behandelen

Schoonmaak/desinfectie

Dagelijks schoonmaak van cohort unit met extra aandacht voor horizontale oppervlakken en contactpunten die regelmatig door de patienten worden aangeraakt (volgens protocol reiniging en desinfectie).

Gezamenlijke sanitair tweemaal per dag reinigen.

Bij opheffen cohort unit:

- Alle disposable materialen weggooien,
- Linnengoed in de was deponeren,
- Materialen voor hergebruik reinigen en desinfecteren met alcohol 70%.
- Normale schoonmaak, daarna einddesinfectie (zie protocol reiniging en desinfectie).
- Ruimte goed ventileren.
- Hierna kan unit weer in gebruik worden genomen en zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) niet meer nodig.

Gerelateerde documenten

- Protocol reiniging en desinfectie na opname COVID-19 patiënt.