


Naam document: Werkwijze druppel contact plus isolatie COVID-19			
Versie: 10 augustus 2020 V2	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

Doel

Voorkomen van verspreiding van COVID-19 bij een opname van een COVID-19 verdachte of positieve patiënt.

Wanneer

Dit protocol is van toepassing bij opname van een COVID-19 verdachte of positieve patiënt op een éénpersoonskamer met eigen bad en toilet.

Benodigheden

- Handalcohol
- Wastafel met zeep, stromend water en papieren handdoekjes, afvalton
- Langemouwschort (vochtwerend)
- Chirurgisch mondneusmasker (type IIR)
- FFP2 of KN95 mondneusmasker bij aërosolvormende handelingen
- Handschoenen
- Spatbril of faceshield

Algemeen


- Bewaar afstand van meer dan 1,5 meter tot de patiënt wanneer dat kan.
- Bij COVID-19 verdachte patiënten worden altijd isolatie op een éénpersoonskamer toegepast, met eigen bad en toilet.
- Op spoedeisende hulp en intensive care wordt altijd FFP2 of KN95 masker gedragen.
- Bij COVID-19 positieve patiënten kan cohortisolatie worden toegepast, zie het protocol Cohortisolatie COVID-19.
- Houd de deuren van de kamer gesloten.
- Tijdens patiëntenzorg kan het faceshield en chirurgisch masker maximaal 3-4 uur gedragen worden. Bij pauzeren of andere werkzaamheden, faceshield verwijderen en chirurgisch mondneusmasker vervangen voor eigen mondneusmasker.

Aankleden PPE

- Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen aan vóór het betreden van de kamer.
- Hanteer hierbij deze volgorde:
 - Indien nodig: verwijder eigen mondneusmasker
 - Handenwassen of desinfecteren
 - Doe het schort aan, schrijf je naam op een sticker op het schort
 - Zet het chirurgische masker op
 - Zet een spatbril of faceshield op
 - Doe de handschoenen aan

Uitkleden PPE

- Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen uit vóór het verlaten van de kamer.
- Hanteer hierbij deze volgorde:
 - Op de kamer: handschoenen uittrekken
 - Trek het schort uit
 - Handenwassen of desinfecteren
 - Verlaat de kamer
 - Doe spatbril of faceshield af
 - Doe masker af
 - Handenwassen of desinfecteren

Naam document: Werkwijze druppel contact plus isolatie COVID-19			
Versie: 10 augustus 2020 V2	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

Voedsel

Op normale wijze behandelen.

Feces, urine en braaksel

Op normale wijze afvoeren.

Linnengoed

In rode linnenzak.

Serviesgoed

Op normale wijze behandelen.

Afval

Volgens de vastgestelde afvalscheidingsprocedure.

Materialen

- Alle benodigdheden voor verpleging en eenvoudig onderzoek moeten in de kamer aanwezig zijn.
- Voorraad op de kamer zo klein mogelijk houden.
- Materialen zoveel mogelijk op kamer laten en patiëntgebonden gebruiken. Bij voorkeur disposable.
- Bij verwijderen van kamer: reinigen en daarna desinfecteren met alcohol 70%.

Instrumentarium

Op normale wijze behandelen.

Schoonmaak/desinfectie tijdens opname

- Dagelijks normale schoonmaak.
- Twee keer per dag desinfectie van tastpunten (deurklinken, handgrepen, lichtknoppen etc.).

Schoonmaak/desinfectie na ontslag

- Bij negatieve uitslag verdachte COVID-19 patiënt kan patiënt verplaatst worden naar juiste afdeling. Kamer wordt schoongemaakt volgens normale procedure.
- Bij ontslag van positieve COVID-19 patiënt schoonmaak en einddesinfectie van de kamer. Zie protocol Reiniging en desinfectie na opname COVID-19 patiënt.

Gerelateerde documenten

- Reiniging en desinfectie na opname COVID-19 patiënt.
- Werkwijze cohortisolatie COVID-19.