

## **Protocol COVID uitbraak ziekenhuizen**

Datum: 18-10-2021

Auteurs: infectiologen en medisch microbiologen. In overleg met infectie preventie AZP.

**Achtergrond:** Suriname bevindt zich inmiddels in een ernstige vierde COVID-19 golf. Ook binnen de ziekenhuizen zijn, zowel op de klinische afdelingen als bij het personeel, diverse uitbraken geweest. Dit document dient als handleiding om dergelijke uitbraken beheersbaar te houden.

### **Uitbraak personeel**

Wanneer een personeelslid geïnfecteerd blijkt te zijn met COVID-19 worden de afdeling en de directe collega's geïnformeerd. De collega's die nauw contact hebben gehad (>15 minuten op <1.5m) zijn vanaf dat moment in quarantaine. Zij kunnen, indien het essentiële zorgmedewerkers betreft, wel gewoon blijven werken volgens het protocol. Zij dragen hierbij minimaal een chirurgisch mondneusmasker type IIR en passen frequent handhygiëne toe.

Op de dag dat het resultaat bekend is wordt aan alle collega's die nauw contact hebben gehad een COVID swab (voor antigeen- of PCR-test) aangeboden. Deze wordt herhaald 5 dagen na het laatste contact.

Wanneer een PCR wordt verricht kan bij een negatieve test op dag 5 de quarantaine worden opgeheven. Wanneer een antigeentest wordt verricht dient op dag 6 de test herhaald te worden, en kan de quarantaine opgeheven worden bij 2 negatieve antigeentesten.

Bij het ontstaan van klachten wordt direct een PCR test ingezet.

Bij personeelsleden die buiten het ziekenhuis een COVID contact hebben gehad (bijvoorbeeld familieleden, vrienden enzovoorts) wordt hetzelfde beleid gehanteerd.

### **Uitbraak afdeling**

Wanneer een patiënt op een afdeling positief blijkt te zijn voor COVID-19 dienen de andere patiënten op dezelfde zaal in quarantaine geplaatst te worden. Dit betekent dat er op de betreffende zaal geen patiënten meer opgenomen kunnen worden en dat bezoek niet toegestaan is, totdat de quarantaine wordt opgeheven.

Bij de zaalgenoten wordt diagnostiek middels een PCR of antigeentest ingezet zodra de positieve patiënt geïdentificeerd is. Na 5 dagen wordt deze test herhaald. Bij een negatief PCR resultaat op dag 5 wordt de quarantaine opgeheven, bij een negatieve antigeentest is op dag 6 een tweede negatieve test vereist.

Bij zaalgenoten die klachten ontwikkelen wordt direct een PCR ingezet.

### **Werknemers met klachten**

Bij werknemers met klachten wordt eerst een antigeentest ingezet. Indien deze positief is gaat de werknemer volgens protocol in isolatie. Bij een negatieve antigeentest wordt een PCR ingezet en kan de werknemer het werk voortzetten, in afwachting op het PCR resultaat. Hierbij wordt wel een chirurgisch mondneusmasker gedragen en frequent handhygiëne toegepast.